

Resolución

Como Q debe ser un punto que al proyectarlo en el plano dado nos dé P , entonces debe cumplirse que Q sea un punto de la recta ortogonal al plano que pasa por P . Buscamos la recta mencionada y veamos cuál de los puntos dados pertenece a la misma. La recta tiene que tener la dirección de la normal del plano y pasar por el punto P , por lo tanto, la ecuación de la recta es: $\{(x, y, z) = \alpha(1, -3, -1) + (1, 3, -9)\}$. El único punto de las opciones que cumple que pertenece a la recta es el que se ofrece en la opción B). Estos contenidos los encontrás en las sesiones 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 pto.)

Elegí la opción que muestra un posible valor de k para que el conjunto $\{(1, -1, 1), (1, 1, 3), (1, -3, k)\}$ sea linealmente dependiente.

- A) -2
- B) -1
- C) 0
- D) 1

Respuesta: B)

Resolución

A partir de $\{(1, -1, 1), (1, 1, 3), (1, -3, k)\}$ tomando las dos primera coordenadas tenemos el sistema de ecuaciones $\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ -\alpha + \beta = -3 \end{cases}$. De donde obtenemos que $\alpha = 2$ y $\beta = -1$. Usando esto en la tercer componente nos queda que $-1 = 2 - 3 = 2 + 3 \cdot (-1) = k$. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 4.

- Ejercicio 6 (1.25 pto.)

Elegí la opción que indica los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(2, 0, -1), (2, k, 0), (0, 1, k+2)\}$ no sea una base de \mathbb{R}^3 .

- A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}\}$
- B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}\}$
- C) $k \in \{-1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}\}$
- D) $k \in \emptyset$

Respuesta: C)

Resolución

Para que el conjunto $\{(2, 0, -1), (2, k, 0), (0, 1, k+2)\}$ no sea base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(2, 0, -1) = m(2, k, 0) + n(0, 1, k+2)$, de la primer componente tenemos que $2 = 2m$ o sea que $m = 1$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} 0 = k + n \\ -1 = n(k + 2) \end{cases}$. De aquí despejamos $n = -k$ y $-1 = -k(k + 2)$, de esta última obtenemos $k^2 + 2k - 1 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 4.

- Ejercicio 7 (1.25 pto.)

Indica la única opción que corresponde a una circunferencia que tenga el mismo centro que $x^2 + y^2 - 9x + 6y + 13,25 = 0$ y cuyo radio sea la mitad del de ésta.

- A) $(x - 4, 5)^2 + (y + 3)^2 = 16$
- B) $x^2 + y^2 - 9x + 6y + 21,25 = 0$
- C) $(x - 4, 5)^2 + (y + 3)^2 = 4$
- D) $(x + 4, 5)^2 + (y - 3)^2 = 8$

Respuesta: C)

Resolución

Completando cuadrados podemos obtener la expresión canónica de la circunferencia $(x - 4, 5)^2 + (y + 3)^2 = 16$ de la que surge que su centro $C = (4, 5; -3)$ y radio 4 . La circunferencia que cumple con lo pedido es aquella que tiene las mismas coordenadas del centro y radio 2. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 5.

- Ejercicio 8 (1.25 pto.)

La parábola P tiene vértice $V = (1; 2)$ y foco $F = (-3; 2)$.

Seleccioná la única opción que contiene su expresión canónica y la ecuación de su directriz.

- A) $16(x - 1) = (y - 2)^2$; directriz: $x = 5$
- B) $-8(x + 1) = (y + 2)^2$; directriz: $x = -3$
- C) $(x - 1)^2 = -16(y - 2)$; directriz: $y = 6$
- D) $(y - 2)^2 = -16(x - 1)$; directriz: $x = 5$

Respuesta: D)

Resolución

Teniendo en cuenta las coordenadas del vértice y el foco, podemos afirmar que la parábola es de la forma $(y - y_v)^2 = -2p(x - x_v)$, y la ecuación de su directriz: $x = x_v + \frac{p}{2}$. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 6.
