
- Ejercicio 4 (1.25 puntos)

Elegí la opción que indica las coordenadas de los vértices de la elipse de ecuación $16x^2 + 9y^2 + 112x - 45y + 108,25 = 0$.

- A) $(6,5; -3,5), (-1,5; -3,5), (2,5; -6,5), (2,5; -0,5)$
- B) $(-3,5; 6,5), (-3,5; -1,5), (-6,5; 2,5), (-0,5; 2,5)$
- C) $(-6,5; 3,5), (1,5; 3,5), (-2,5; 6,5), (-2,5; 0,5)$
- D) $(3,5; -6,5), (3,5; 1,5), (6,5; -2,5), (0,5; -2,5)$

Opción correcta: B)

Resolución

La ecuación de la elipse $16x^2 + 9y^2 + 112x - 45y + 108,25 = 0$ puede reescribirse como $\frac{(x+3,5)^2}{9} + \frac{(y-2,5)^2}{16} = 1$ tiene como centro al punto $(-3,5; 2,5)$. Como $a = 4$, desplazándose 4 unidades hacia arriba y hacia abajo del centro se obtienen, respectivamente, los vértices $(-3,5; 6,5)$ y $(-3,5; -1,5)$. Como $b = 3$, desplazándose 3 unidades hacia la izquierda y hacia la derecha del centro se obtienen, respectivamente, los vértices $(-6,5; 2,5)$ y $(-0,5; 2,5)$. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 5.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)

Considerá los vectores: $\vec{v}_1 = \left(\frac{3}{4}; -1; 3\right)$, $\vec{v}_2 = (\sqrt{5}; -2\sqrt{5}; 2\sqrt{5})$ y $\vec{v}_3 = \sqrt{5}\vec{v}_2 - \vec{v}_1$. Elegí la única opción que muestra el resultado de $\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_3$.

- A) $\frac{145}{4}$
- B) $\frac{5\sqrt{153}}{4}$
- C) $\frac{145\sqrt{5}}{4}$
- D) $\left(-\frac{17\sqrt{5}}{4}; -18\sqrt{5}; 14\sqrt{5}\right)$

Opción correcta: C)

Resolución

Para encontrar la respuesta, primero hay que calcular las coordenadas de \vec{v}_3 :
 $\vec{v}_3 = \sqrt{5}(\sqrt{5}; -2\sqrt{5}; 2\sqrt{5}) - \left(\frac{3}{4}; -1; 3\right) = \left(\frac{17}{4}; -9; 7\right)$. Y luego queda pendiente realizar el producto escalar: $\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_3 = (\sqrt{5}; -2\sqrt{5}; 2\sqrt{5}) \cdot \left(\frac{17}{4}; -9; 7\right) = \frac{145\sqrt{5}}{4}$. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)

$\vec{w} = (w_x; w_y)$ es un vector de norma $\sqrt{34}$ del primer cuadrante, que forma un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ con el vector $\vec{v} = (-1; 4)$. Elegí la única opción que indica la coordenada w_y .

- A) 5
- B) $\frac{4}{17}$
- C) 3
- D) -5

Opción correcta: A)

Resolución

Como \vec{w} tiene norma $\sqrt{34}$ podemos plantear que $\sqrt{w_x^2 + w_y^2} = \sqrt{34}$. además, como el ángulo que forman \vec{w} y $\vec{v} = (-1; 4)$ es $\frac{\pi}{4}$ se puede plantear que: $\vec{v} \cdot \vec{w} = \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$. De estas dos ecuaciones se puede deducir que $(4w_y - 17)^2 + w_y^2 = 34$ con lo cual $w_y = 3$ o $w_y = 5$. Si $w_y = 3$ resulta que $w_x = -5$, se descarta esta opción porque \vec{w} es un vector del primer cuadrante. Si $w_y = 5$ resulta $w_x = 3$. Es decir, $\vec{w} = (3; 5)$ y este vector sí es del primer cuadrante. Luego la respuesta es $w_y = 5$. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)

Considerá el plano $\Pi_1 : -6y + z = 4$ y Π_2 otro plano del cual se conoce que contiene a eje x y al punto $(0; -2; 2)$. Indicá la única opción que muestra el resultado de $\Pi_1 \cap \Pi_2$.

- A) $\{(x, y, z) = \lambda(1; 0; 0) + (0; -\frac{4}{7}; \frac{4}{7}), \lambda \in \mathbb{R}\}$
- B) $\{(x; y; z) = \lambda(0; 2; -2) + (-\frac{2}{7}; 0; 0), \lambda \in \mathbb{R}\}$
- C) $\{(0; -2; 2)\}$
- D) $\{(x, y, z) = \lambda(1; -6; 6) + (0; -4; 4), \lambda \in \mathbb{R}\}$

Opción correcta:A)

Resolución

Construimos el plano Π_2 : una de sus direcciones es el vector $(1; 0; 0)$ ya que el plano contiene al eje x ; además, otra dirección se consigue restando dos puntos uno de ellos puede ser el $(0; 0; 0)$ y el otro $(0; -2; 2)$, por eso el vector $(0; 2; -2)$ es una dirección del plano. Nos queda que la ecuación vectorial del plano es $(x; y; z) = \alpha(1; 0; 0) + \beta(0; 2; -2) = (\alpha; 2\beta; -2\beta)$. Al reemplazar en la ecuación del primer plano, despejamos $-6.(2\beta) + (-2\beta) = 4$ y obtenemos que $\beta = -\frac{2}{7}$. Concluimos entonces, al reemplazar este dato en la ecuación del segundo plano, que la intersección buscada es una recta de ecuación: $\lambda(1; 0; 0) + (0; -\frac{4}{7}; \frac{4}{7})$. Estos contenidos los podés encontrar en las sesiones 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)

Indicá la opción que muestra el punto simétrico a $P = (-7; 1; 3)$ respecto del plano de ecuación vectorial $\Pi = \{(x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 : \alpha(\frac{1}{2}; 0; \frac{3}{4}) + \beta(0; 1; -\frac{1}{2}) + (-1; 5; 0), \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

- A) $(\frac{11}{7}; -\frac{13}{7}; -\frac{19}{7})$
- B) $(\frac{19}{7}; -\frac{3}{7}; -\frac{1}{7})$
- C) $(\frac{3}{7}; -\frac{1}{7}; \frac{12}{7})$
- D) $(-\frac{3}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{2})$

Opción correcta: A)

Resolución

Lo primero que podemos hacer es escribir el plano en forma implícita el cual nos queda $-3x + y + 2z = 8$. Luego, pensemos en la recta con dirección $(-3; 1; 2)$ y que pasa por el punto P . Al hallar la intersección de esta recta con el plano, obtenemos el punto Q . El punto simétrico P' pedido se puede despejar como $\frac{P+P'}{2} = Q$. Estos contenidos los podés encontrar en las sesiones 2 y 3.
