

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)

Considerá las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ y

$D = -2A \cdot B^t \cdot C^{-1}$ Elegí la única opción que muestra el valor del coeficiente d_{21} .

A) $d_{21} = \frac{35}{2}$

B) $d_{21} = -\frac{35}{4}$

C) $d_{21} = 16$

D) $d_{21} = 6$

Opción correcta: D)

Resolución:

$$-2A \cdot B^t \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 8 & -2 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

La matriz solicitada $D = \begin{pmatrix} 26 & -6 & 34 \\ 8 & 12 & -8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ por lo que el coeficiente

$d_{21} = 8 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{2} + (-8) \cdot \frac{1}{2} = 6$ Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 9.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)

Considerá la siguiente ecuación matricial $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Indicá cuál es la única opción que muestra su conjunto solución.

A) $\{X \in \mathbb{R}^3 : X = t(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1), t \in \mathbb{R}\}$

B) $\{(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1)\}$

C) $\{X \in \mathbb{R}^3 : X = t(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1) + (\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, 0), t \in \mathbb{R}\}$

D) $\{X \in \mathbb{R}^3 : X = t(1, 1, 1), t \in \mathbb{R}\}$

Opción correcta: C)

Resolución: si el sistema dado se resuelve en forma matricial y se triangula la matriz ampliada,

se obtiene $\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ Al reescribir este sistema, se obtienen dos ecuaciones con tres

incógnitas. De la segunda ecuación se obtiene $y = \frac{4}{5}z + \frac{1}{5}$. Al reemplazarla en la primera ecuación, se obtiene $x = \frac{3}{5}z + \frac{2}{5}$. Luego, todo punto solución del sistema es de la forma $(\frac{3}{5}z + \frac{2}{5}, \frac{4}{5}z + \frac{1}{5}, z)$ siendo $z \in \mathbb{R}$. Estos contenidos los podés encontrar en las sesiones 8 y 9.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)

Considerá la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(x; y) = (x + y; x - 3y)$. Elegí la opción que muestra la dimensión de $\text{Im}(T^{-1})$.

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Opción correcta: C)

Resolución: dado que T en su forma matricial es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ Entonces $A_T^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

Para conocer la dimensión de la imagen nos basta con triangular A_T^{-1} , lo que nos da $\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$. con lo cual concluimos que la dimensión de la imagen de T es 2. Estos contenidos los podés encontrar en las sesiones 11 y 12.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)

Considerá la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x; y; z) = (x + 3y + z; x - 2y - z; 2x + y)$. Elegí la opción que muestra la dimensión de $\text{Nu}(T)$.

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Opción correcta: B)

Resolución: dado que T en su forma matricial es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ Para conocer la dimensión del núcleo nos basta con triangular A_T , lo que nos da $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ con lo cual concluimos que la dimensión de la imagen de T es 2. Entonces por el teorema de la dimensión debe ser que la dimensión del núcleo es 1. Estos contenidos los podés encontrar en las sesiones 11 y 12.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)

Considerá los complejos $w = -1 - i$ y $z = 1 - \sqrt{3}i$. Elegí la opción que muestra el resultado de $w^{-3} \cdot z^{10}$.

A) $256\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$

B) $256\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)$

C) $1024\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) \right)$

D) $256\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) \right)$

Opción correcta: D)

Resolución: para resolver el cálculo $w^{-3} \cdot z^{10}$ es conveniente escribir en forma polar cada uno de los complejos:

$$w = -1 - i = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right) \rightarrow w^{-3} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$z = 1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) \right) \rightarrow z^{10} = 2^{10} \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)$$

$$w^{-3} \cdot z^{10} = 256\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) \right)$$

Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 13.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)

Considerá $z \in \mathbb{C}$. Elegí la única opción que contiene una de las soluciones de la ecuación $z - 10i = 21z^{-1}$.

A) $-7i$

B) $3i$

C) $\frac{10i+4}{2}$

D) $-3i$

Opción correcta: B)

Resolución: la ecuación $z - 10i = 21z^{-1}$ puede ser escrita como $z^2 - 10iz - 21 = 0$. Al ser una ecuación cuadrática de coeficientes complejos, se pueden calcular las soluciones mediante la fórmula resolvente: $\frac{10i \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{10i \pm 4i}{2}$ y obtener que las soluciones son $3i$ y $7i$. Una de ellas es la que se ofrece como opción correcta. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 13.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)

Considerá los polinomios $P(x) = x^4 - 3kx^2 + 5x - 27k$, con $k \in \mathbb{R}$; $Q(x) = x^2 - 5x + 9$ y $R(x) = -20x - 144$. Indicá el valor de k para que el resto de dividir a P por Q sea R .

- A) $k = 4$
- B) $k = 1$
- C) $k = -1$
- D) $k = 7$

Opción correcta: A)

Resolución: al realizar la división de P por Q se obtiene como resto al polinomio $(-15k+24)x-144$, como este debe coincidir con R , igualando coeficientes obtendremos que el valor de k debe ser $k = 4$. Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 14.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)

Sea P el polinomio de mínimo grado, con coeficientes reales que tiene a $-1 + 2i$ como una de sus raíces con multiplicidad 2; $x = -3$ como raíz simple y $x = 0$ como raíz triple. Indicá cuál debe ser su coeficiente principal para que se cumpla que $P(2i) = -6 + 61i$

- A) $\frac{1}{2}$
- B) -2
- C) $\frac{1}{8}$
- D) $-\frac{1}{64}$

Opción correcta: C)

Resolución: con los datos del problema, se puede deducir que un polinomio de grado mínimo que cumple las condiciones pedidas debe ser $P = a(x - (-1 + 2i))^2(x - (-1 - 2i))^2(x + 3)x^3$, dado que al tener coeficientes reales, también tendremos como raíz doble a $-1 - 2i$. El coeficiente principal a , lo obtenemos del dato $P(2i) = -6 + 61i$ y despejando de esta ecuación el valor de a . Estos contenidos los podés encontrar en la sesión 14.
