



# ANÁLISIS MATEMÁTICO A Ingeniería - Ciencias Exactas y Naturales EJERCICIOS RESUELTOS DE LÍMITE Y CONTINUIDAD





Silvia Del Duca Silvia Vietri

# Índice general

2.	Ejer	rcicios resueltos	2
	2.1.	Límites	2
	2.2.	Asíntotas	3
	2.3.	Continuidad	6
	2.4.	Teorema de Bolzano	7

## Notas para Práctica 2

## Ejercicios resueltos

#### 2.1. Límites

**Ejercicio 2.1.** La ecuación  $ax^2 + 2x - 1 = 0$ , donde a es una constante positiva, tiene dos raíces que dependen del valor de a:

$$r_1(a) = -\frac{1}{a} + \frac{\sqrt{1+a}}{a}$$
 y  $r_2(a) = -\frac{1}{a} - \frac{\sqrt{1+a}}{a}$ 

- a. Verificar que si a > 0, las dos raíces de la ecuación son reales, una positiva y la otra negativa.
- b. Calcular  $\lim_{a\to 0} r_1(a)$  y  $\lim_{a\to 0} r_2(a)$ .
- c. Interpretar los resultados obtenidos, trazando simultáneamente la gráfica de la función  $f(x) = ax^2 + 2x 1$ , para valores de a tendiendo a cero (por ejemplo, a = 1; 0, 5; 0, 2; 0, 1; 0, 05).

#### Solución:

- a. Para verificar que si a > 0, las dos raíces de la ecuación son reales (una positiva y la otra negativa), analicemos cada una de ellas:
  - $r_1(a) = \frac{\sqrt{1+a}-1}{a}$ : como a > 0, el radicando es positivo y mayor que 1, por lo tanto el numerador es positivo y el denominador también. Entonces  $r_1(a)$  es una raíz real y positiva de la ecuación dada;
  - $r_2(a) = -\frac{\left(\sqrt{1+a}+1\right)}{a}$ : como antes, tiene un radicando positivo, mayor que 1, por lo tanto el numerador es positivo y el denominador también. Pero el signo menos adelante, cambia el signo de la raíz. Entonces  $r_2(a)$  es una raíz real y negativa de la ecuación dada.



b. Calculemos el límite de estas dos funciones, cuando el valor de a tiende a cero:

$$\lim_{a \to 0} r_1(a) = \lim_{a \to 0} \frac{(\sqrt{1+a} - 1)}{a} \cdot \frac{(\sqrt{1+a} + 1)}{(\sqrt{1+a} + 1)}$$


$$= \lim_{a \to 0} \frac{1+a-1}{a(\sqrt{1+a} + 1)}$$

$$= \lim_{a \to 0} \frac{1}{\sqrt{1+a} + 1}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\lim_{a \to 0} r_2(a) = \lim_{a \to 0} -\frac{(\sqrt{1+a}+1)}{a}$$
$$= -\infty$$

c. Veamos el gráfico para distintos valores de a



#### 2.2. Asíntotas

**Ejercicio 2.2.** Hallar todas las asíntotas de la función  $f(x) = 2x + \sqrt{1+x^2}$ .

#### Solución:

Asíntota horizontal: y = c.



• En este caso hay que analizar el limite de la función tendiendo a más y menos infinito.

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \left( 2x + \sqrt{1 + x^2} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \left( 2x + \sqrt{1 + x^2} \right) = -\infty$$

Por lo tanto, no hay asintota horizontal.

Asíntotas oblicuas: y = mx + b

- Iniciamos calculando el valor de la pendiente. Para lo cual, es necesario, primero, analizar lo que sucede cuando  $x \to -\infty$ :
  - $m = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{2x + \sqrt{1 + x^2}}{x} = \lim_{x \to -\infty} 2 + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x}$
  - Como en este caso x es menor que cero, podemos escribir  $\frac{1}{x} = -\frac{1}{\sqrt{x^2}}$
  - $m = \lim_{x \to -\infty} 2 \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} = 1$
  - Entonces la pendiente de la recta oblicua vale 1
  - ullet Estudiemos la existencia de b para el valor de m hallado:

$$\begin{array}{ll} b & = & \lim_{x \to -\infty} \left( f\left( x \right) - mx \right) \\ & = & \lim_{x \to -\infty} \left( 2x + \sqrt{1 + x^2} - x \right) \\ & = & \lim_{x \to -\infty} \left( x + \sqrt{1 + x^2} \right) \cdot \frac{\left( x - \sqrt{1 + x^2} \right)}{\left( x - \sqrt{1 + x^2} \right)} \\ & = & \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 - 1 - x^2}{x - \sqrt{1 + x^2}} \\ & = & \lim_{x \to -\infty} \frac{-1}{x - \sqrt{1 + x^2}} \\ & = & 0 \end{array}$$

- Podemos afirmar que f(x) tiene una asíntota oblicua de ecuación y = x, cuando x tiende a menos infinito.
- Ahora analizamos lo que sucede cuando  $x \to +\infty$ :
  - Como en este caso x es mayor que cero, entonces podemos escribir  $\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$



• Calculamos el valor de m:

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{2x + \sqrt{1 + x^2}}{x}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 2 + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 2 + \sqrt{\frac{1 + x^2}{x^2}}$$

$$= 3$$

- Entonces la pendiente de la recta oblicua vale 3
- $\bullet$  Estudiemos la existencia de b para el valor de m hallado:

$$b = \lim_{x \to +\infty} f(x) - mx$$


$$= \lim_{x \to +\infty} 2x + \sqrt{1 + x^2} - 3x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} (\sqrt{1 + x^2} - x) \frac{(\sqrt{1 + x^2} + x)}{(\sqrt{1 + x^2} + x)}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + x^2} + x} = 0$$

• Podemos afirmar que f(x) tiene una asíntota oblicua de ecuación y = 3x, cuando x tiende a más infinito.

Por el análisis efectuado del comportamiento de la función, concluimos que f(x) tiene asíntotas oblicuas cuando  $x \to \pm \infty$ . Como su dominio son todos los números reales, no tiene asíntotas verticales. Y como se vio, tampoco tiene asíntota horizontal. Si usamos algún programa de matemática, se puede observar que la gráfica es la siguiente:



UBA XXI

Silvina Del Duca - Silvia Vietri

#### 2.3. Continuidad

Ejercicio 2.3. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-1}{3x-3} & si & x > 1\\ \frac{x^2-x}{4x-4} & si & x < 1 \end{cases}$$

Analizar la continuidad de f(x).

#### Solución:

- Si x > 1, f(x) es continua ya que se trata de un cociente de funciones continuas, porque el denominador se anula en x = 1 que no pertenece al conjunto que se analiza.
- Si x < 1, f(x) es continua por ser cociente de funciones continuas, ambos polinomios; y el denominador se anula en x = 1 que tampoco está en el intervalo que se analiza.
- En x = 1, la función no está definida, por lo tanto falla la primera condición de continuidad. Ya sabemos que la función es discontinua en x = 1.
- Analicemos qué tipo de discontinuidad tiene en ese punto ( evitable, o esencial o no evitable). Para eso calculamos x tendiendo a 1 por derecha y luego por izquierda.

$$\lim_{x \to 1^{+}} f(x) = \lim_{x \to 1^{+}} f(x)$$

$$= \lim_{x \to 1^{+}} \frac{\sqrt{x} - 1}{3x - 3}$$

$$= \lim_{x \to 1^{+}} (\frac{\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(3x - 3)(\sqrt{x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \to 1^{+}} \frac{(\sqrt{x})^{2} - 1}{3(x - 1)(\sqrt{x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \to 1^{+}} \frac{1}{3(\sqrt{x} + 1)}$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{2}}$$

$$\lim_{x \to 1^{-}} f(x) = \lim_{x \to 1^{-}} \frac{x^{2} - x}{4x - 4}$$

$$= \lim_{x \to 1^{-}} \frac{x(x - 1)}{4(x - 1)}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x}{4}$$

$$= \frac{1}{4}$$



Como los límites laterales son distintos, entonces no existe  $\lim_{x\to 1} f(x)$ , es decir, la discontinuidad en x=1 es esencial o no evitable.

#### 2.4. Teorema de Bolzano

Ejercicio 2.4. Dada la siguiente ecuación, demostrar que tienen alguna solución real.

$$x\cos(\frac{x}{2}) + 15\sin(x) = 15$$

#### Solución:

- Armemos la función  $f(x) = x \cos(\frac{x}{2}) + 15 \sin(x) 15$ . Queremos probar que existe por lo menos un valor real donde f vale cero
- lacktriangle Como es una suma algebraica de funciones continuas en todos los reales, es una función continua en  $\mathbb{R}$
- Aplicaremos entonces el *Teorema de Bolzano* en el intervalo  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$   $f(0) = 0.\cos(0) + 15\sin(0) - 15 = -15 < 0$  $f(\pi/2) = \frac{\pi}{2}.\cos(\frac{\pi}{4}) + 15\sin(\frac{\pi}{2}) - 15 = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} + 15 - 15 = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} > 0.$
- Entonces, como f es continua en  $[0,\frac{\pi}{2}]$  y tiene signo contrario en los extremos del intervalo, por Teorema de Bolzano, existe por lo menos un punto  $c\epsilon[0,\frac{\pi}{2}]$ , donde f(c)=0, es decir, existe por lo menos una solución de la ecuación dada.