

Segundo Parcial 10/06/2025 - Tema 2

1. Sea $p(x) = 7 + 5(x-2) + \frac{5}{2}(x-2)^2$ el polinomio de Taylor de orden 2 de la función f centrado en $x = 2$ y sea la función $g(x) = f(x^2 - 14) + x \cdot f'(x-2)$

(a) (1 punto) Calcular $g'(4)$:

.....65.....

(b) (1 punto) Calcular el polinomio de Taylor de orden 1 de g centrado en $x_0 = 4$:

..... $P(x) = 27 + 65(x-4)$

Resolución:

Del polinomio de f se sabe $f(2) = 7$

$$f'(2) = 5 \text{ y } f''(2) = 5$$

$$g(4) = f(2) + 4f'(2) = 27$$

$$g'(x) = f'(x^2 - 14) \cdot 2x + f'(x-2) + x \cdot f''(x-2)$$

$$g'(4) = f'(2) \cdot 8 + f'(2) + 4 \cdot f''(2) = 65$$

El polinomio pedido es: $P(x) = 27 + 65(x-4)$

2. (2 puntos) Hallar todos los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \cdot \sqrt{3^n}}{4^n - 1}$ es convergente.

☐ $x \in \left(-\frac{4}{\sqrt{3}}; \frac{4}{\sqrt{3}}\right]$

☐ $x \in [\sqrt{3}; 4]$

☒ $x \in \left(-\frac{4}{\sqrt{3}}; \frac{4}{\sqrt{3}}\right)$

☐ $x \in (\sqrt{3}; 4)$

Resolución:

Por criterio de raíz enésima, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n \cdot \sqrt{3^n}}{4^n - 1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sqrt{3^n}}{4^n - 1}} \cdot |x| = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot |x| < 1 \rightarrow$

$$|x| < \frac{4}{\sqrt{3}} \rightarrow x \in \left(-\frac{4}{\sqrt{3}}; \frac{4}{\sqrt{3}}\right)$$

Para analizar los extremos del intervalo se reemplaza en la serie los valores de x , en ambos casos la serie numérica es divergente (término general no tiende a 0)

3. (1 punto) Hallar $a > 0$ de modo que el área de la región encerrada entre los gráficos de $f(x) = a\sqrt{x}$ y $g(x) = x^2 - 2x$ para $0 \leq x \leq 1$ sea $\frac{13}{3}$.
 $a = \dots\dots\dots \frac{11}{2} \dots\dots\dots$

Resolución:

$$\int_0^1 a\sqrt{x} - (x^2 - 2x)dx = a \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} + 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}a + \frac{2}{3} = \frac{13}{3} \quad \longrightarrow a = \frac{11}{2}$$

4. Calcular las siguientes primitivas:

(a) (1 punto) $\int \frac{\ln^3(5x+1)}{5x+1} dx = \dots\dots\dots \frac{1}{20} \ln^4(5x+1) + C \dots\dots\dots$

Resolución:

Usando la sustitución $u = \ln(5x+1)$, $\int \frac{\ln^3(5x+1)}{5x+1} dx = \frac{1}{20} \ln^4(5x+1) + C$

(b) (1 punto) $\int \frac{\sqrt[4]{x} + x^3 \cdot \ln(x)}{x} dx = \dots\dots\dots 4x^{\frac{1}{4}} + \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{1}{9}x^3 + C \dots\dots\dots$

Resolución:

$$\int \frac{\sqrt[4]{x} + x^3 \cdot \ln(x)}{x} dx = \int x^{-\frac{3}{4}} dx + \int x^2 \cdot \ln(x) dx = 4x^{\frac{1}{4}} + \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{1}{9}x^3 + C$$

en el segundo término se aplica método de partes con $u = \ln(x)$ $dv = x^2$

5. (1 punto) Sea la función $G(x) = \int_0^{x^3} \cos(t^2) dt$

Calcular $G'(x) = \dots\dots\dots \cos(x^6) \cdot 3x^2 \dots\dots\dots$

Resolución:

Por teorema fundamental del cálculo: $G'(x) = \cos(x^6) \cdot 3x^2$.

6. (2 puntos) Para calcular el área encerrada por los gráficos de las funciones $f(x) = x^2 - x$ y

$$g(x) = \begin{cases} 3x & x \geq 0 \\ -4x & x < 0 \end{cases} \quad \text{se debe resolver:}$$

$$\square \int_{-3}^1 (g(x) - f(x)) dx$$

$$\square \int_0^4 (g(x) - f(x)) dx + \int_{-3}^0 (f(x) - g(x)) dx$$

$$\square \int_0^1 (f(x) - g(x)) dx + \int_{-3}^0 (g(x) - f(x)) dx$$

$$\blacksquare \int_{-3}^4 (g(x) - f(x)) dx$$

Resolución:

Límites de integración: $x^2 - x = 3x$ si $x \geq 0$ $x = 0, x = 4$

$x^2 - x = -4x$ si $x < 0$ $x = 0, x = -3$

en ambos intervalos $g(x) \geq f(x)$ por lo tanto $\int_{-3}^4 (g(x) - f(x)) dx$